

**Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik
zu Frankfurt am Main**

Direktor: Prof. Dr. Gänsslen

**Die Verträglichkeit
des karamelisierten Hafers beim Diabetes
an Hand von Blutzuckerbelastungskurven**

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der gesamten Medizin
der Hohen Medizinischen Fakultät
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität zu Frankfurt a. M.

vorgelegt von

Hildegard Jensch, geb. Bayersdorf,
aus Offenbach a. M.

April 1941

DRUCK: Lengericher Handelsdruckerei, Lengerich (Westf.)

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität zu Frankfurt a. M.

Referent: Prof. Dr. Heupke —
Korreferent: Prof. Dr. Thauer
Dekan: Prof. Dr. Guthmann



Disposition.

Einleitung:

Die wichtigsten Ersatzkohlehydrate der letzten 10 Jahre unter besonderer Berücksichtigung der karamelisierten Ersatzkohlehydrate.

Hauptteil:

- I. a) Versuchsanordnung.
 - b) Küchentechnisches.
 - c) Methodik.
- II. Versuchsergebnis. Besprechung und Analyse der Belastungskurven.
- III. Auswertung und Deutung.
- IV. Zusammenfassung.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41551901_0101

Da heute diätetische Maßnahmen in der Behandlung besonders leichter Diabeteskranker wieder mehr an Bedeutung gewonnen haben, nachdem mittlerweile das Indikationsgebiet des Insulins, trotz Depotinsulin, mehr und mehr für schwere Fälle eingeengt ist, wird die Frage nach der Wahl der dafür geeigneten Kohlehydrate wieder neu gestellt. Zumal besonders heute es nicht ganz leicht ist, Kohlehydrate ohne weiteres, soweit es überhaupt möglich ist, durch Eiweiß und Fette zu ersetzen, wie es in älteren Diätvorschriften meist angegeben wird. Trotz langjährigen Suchens scheint das Präparat, das alle Bedingungen eines Ersatzkohlehydrates erfüllt, immer noch nicht gefunden zu sein, da sich keines der in großer Zahl angegebenen wirklich behauptet hat. Man hat versucht, sogenannte Mehle mit geringem Kohlehydratgehalt herzustellen; in den Diabetikerbiskuits liegt ein solches Gebäck vor, das nur 8% Kohlehydrate enthält. Doch stellt diese Methode keine wirkliche Hilfe für den Diabetiker dar, die Ersatzkohlehydrate sollen vielmehr außer der Sättigung noch Kalorien liefern, Glykogen in der Leber anreichern und die Azidose bekämpfen. Einigermaßen annehmbarer Geschmack und erschwinglicher Preis sind weitere Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Die Urteile über die Brauchbarkeit der angegebenen Ersatzkohlehydrate sind oft sehr widersprechend.

Eines der wichtigsten und zuerst untersuchten ist das *Oxanthin*, ein Dioxyazeton. Lambie und Großmann sind der Anschauung, daß das Oxanthin den Kohlehydratstoffwechsel weniger beeinflußt als die gleiche Menge Glukose und daß es im diabetischen Organismus sofort verwertet wird. Besonders günstig sei die Wirkung, wenn es bei Gefahr der Azidose als Zusatzkohlehydrat gegeben werde. Campbell dagegen ist der Auffassung, daß es im diabetischen Organismus nicht besser als Glukose verwertet wird und als Extraglukose im Harn ausgeschieden wird. Gottschalk, der es auch empfiehlt, fand seine Hauptdomäne in der Bekämpfung der Ketonurie. Das Präparat wird heute nicht mehr verwandt.

Viele Versuche liegen vor über die Verwertung von *Lävulose* und *Galaktose* als Ersatzkohlehydrate. Beide werden nach übereinstimmenden Aussagen besser toleriert als Traubenzucker. Das soll, wie Jovanowitsch annimmt, darauf beruhen, daß Lävulose und Galaktose sofort verbrannt werden, oder daß sie in für den diabetischen Organismus verwertbare Vorstufen des Glykogens umgewandelt werden. Doch soll sich die Toleranz für Lävulose bei längeren Gaben von Tag zu Tag verschlechtern. Das ist wohl der Grund, weshalb Lävulose heute nicht mehr verabreicht wird. Nach Pollak soll Galaktose einen um so größeren zuckermobilisierenden Reiz auf die Leber ausüben, je weniger Insulin zur Verfügung steht. Die Blutzuckerkurven nach Lävulose und Galaktose verlaufen nach Grott parallel und niedriger als nach Dextrosegaben.

Inulin, als Lävulosebildner, verhält sich genau wie diese.

Da Galaktose als Ersatzkohlehydrat außerordentlich teuer ist, empfahl Klein den billigeren und ebenso gut verträglichen *Milchzucker*, doch hat sich auch dieser nicht durchgesetzt.

Nach Pavlzyi, Barvne, Payme und Lawrence verursacht das D-Sorbit *Sionon* eine wesentlich geringere Blutzuckersteigerung als Glukose, besonders wenn es als Zusatzkohlehydrat gegeben wird; dem widersprechend stellten Rayband und Bertrand fest, daß es für die Diabetesbehandlung

ungeeignet sei, daß die bessere Toleranz nur durch langsame Resorption vorgetäuscht werde.

Günstiger ist das Urteil über das Tetraglucosan *Salabrose*, das nach Anschauung der meisten Autoren, wie Petow, Kерб und Brauchli, beim Diabetiker gut zu verwerten ist, da es offenbar ohne Verzuckerung in Glykogen umgewandelt wird. Es hat einen faden Geschmack und hinterläßt lediglich einen süßen Nachgeschmack. Bestehende Azidose werde allerdings niemals besonders günstig beeinflusst.

Von Noorden hat zuerst 1902 nach jahrelangen, eingehenden Versuchen dem Hafer eine ganz besondere Rolle in der Therapie des Diabetes zugewiesen. Seine weitaus bessere Verträglichkeit gegenüber anderen Kohlehydraten ist inzwischen allgemein anerkannt. Hafer ist seither das einzige Ersatzkohlehydrat, das wirklich Eingang in die Therapie des Diabetes gefunden hat und sowohl bei leichtem, mittelschwerem als auch bei schwerstem Diabetes verwandt werden kann.

1903 versuchte Schwartz als erster, karamalisierte Zucker in die Therapie des Diabetes einzuführen, nachdem schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Chemie des über seinen Schmelzpunkt erhitzten Rohrzuckers von Gelis untersucht worden war. Er fand, daß er zerlegt werde in Glukose und Glucosane, von denen er bei weiteren Untersuchungen die Caramelane, die Carameline und die Caramelene unterschied, deren Konstitutionsformeln er auch aufstellte. Später haben Cunninham und Doree, Pictet und Carrer in ausgedehnten wissenschaftlichen Untersuchungen festgestellt, daß es sich um innere Anhydride der Kohlehydrate mit Ringbildung komplizierter Art handelt. Sie bilden Polymerisationsprodukte, die Di- und Tetraglucosane. Die Versuche von Schwartz führten zu keinem Erfolg, da er zu kleine Dosen, nur 20—25 g der karamalisierten Zucker pro Tag, verabreichte.

Die ersten systematischen Arbeiten auf dem Gebiete der Verwendbarkeit der karamalisierten Zucker stammen von Grafe aus dem Jahre 1912. Er ging von der Annahme aus, daß an einer ganz bestimmten Stelle des Zuckermoleküls ein

Hemmnis für den Angriff im diabetischen Organismus vorliegt, daß das Zuckermolekül aber durch kleine chemische Eingriffe, zum Beispiel durch Rösten, soweit verändert würde, daß es im diabetischen Organismus verwertbar ist. Er verwandte zu seinen Versuchen ein Präparat von Merck, *Caramose*, das, durch trockene Erhitzung von Traubenzucker im Vakuum hergestellt, ein hellbraunes lockeres Pulver von angenehmem Geschmack war. Er behandelte anfangs etwa 25 Fälle mit Gaben von 100 g bis 200 g pro Tag und fand, ebenso wie Reimer, der etwa 55 Fälle behandelte, daß Caramose überhaupt keine glykursorische Wirkung hat und daß bei gleicher Glykosurie 20mal soviel Kohlehydrate gegeben werden können wie ungeröstete. Er fand die Anwendung besonders zweckmäßig, wenn nach erzielter Zuckerfreiheit wieder Kohlehydrate gegeben werden sollen; man könne durch diese Methode Insulin sparen. Er ersetzte auch die zur Entzuckerung führenden Hungertage durch Karameltage, an denen Karamel neben Kaffee und Kognak die einzige Nahrung ist. Der große Vorteil liege darin, daß der hohen Kalorienzahl wegen keine Gefahr der Azidose bestehe. Durch Gaben von Karamel über Wochen gelänge es, die Glykosurie langsam zum Schwinden zu bringen, ein Stoffwechselgleichgewicht herzustellen, ohne Azidose zu riskieren, und die Ernährung sicherzustellen.

Von Noorden fand ebenfalls, daß Karamel besonders günstig wirkt, wenn es als einzige Nahrung gegeben wird, besonders geeignet bei Beginn einer Diabetestherapie zur Entzuckerung und zur Beseitigung der Azidose. Doch warnt er vor zu langen Gaben, da dann bei schon Entzuckerten manchmal wieder Glykosurie auftrat. Die besten Erfolge hatte er bei jugendlichen Diabetikern bei längerem Gebrauch in täglichen Gaben von 50—75 g.

Majin und Turban zeigten, daß nach Karamel nur eine geringfügige, nach einer Stunde abgeklungene Steigerung des Blutzuckers auftritt.

Aus Untersuchungen am respiratorischen Gaswechsel von Grafe und Büchner geht hervor, daß Karamel im Organis-

mus verbrannt wird, aber nicht so verbrennt wie das unveränderte Ausgangsmaterial, das den respiratorischen Quotienten viel höher treibt. Die relativ geringe Erhöhung des respiratorischen Quotienten läßt sich mit einer verlangsamten Resorption der Röstprodukte erklären. Dafür spricht auch, daß die Erhöhung des respiratorischen Quotienten relativ lange anhält.

Karamel wird nach Grafe etwas schlechter ausgenützt als Zucker; seine Versuche ergaben, daß 12—15 % im Kot wieder erscheinen.

Ebenso günstig wirkt Karamel nach Untersuchungen von Grafe auch geröstetes Weizenmehl in Form von dünnen Toastscheiben, gerösteter Reis und geröstete Kartoffelscheiben. Sie sind nur schlechter zu rösten und man muß sich damit begnügen, ein Drittel der Stärke unverändert zu lassen, der Schwierigkeit des Röstprozesses wegen.

Es sind verschiedene Theorien darüber aufgestellt worden, warum die gerösteten Kohlehydrate besser verträglich sind als ihre ungerösteten Ausgangsprodukte. Kерб nimmt an, daß die Anhydride sowohl für den Gesunden wie für den Diabetiker unumgängliche Zwischenstufen im Glykogenaufbau sind. Dem Diabetiker fehle nur die Möglichkeit, diese Anhydride herzustellen, er könne aber, wenn man sie ihm in Form eines der genannten Präparate zuführe, aus ihnen Glykogen aufbauen. Ganz übereinstimmend damit nimmt auch Gottschalk an, daß der direkte Übergang in Glykogen das allgemeine Prinzip sei bei der Verwertung der Anhydrozucker. Er fand kein Ferment, das die Glucosane aufspaltet. Erwähnenswert ist unter ihnen das Di-Glucosan *Mellitose*, das nur durch seinen bitteren Geschmack am Erfolg gehindert wurde.

Es lag nahe, zu untersuchen, ob sich die Verträglichkeit des an und für sich für Diabetiker schon weit besser tolerierten Hafers durch Rösten noch steigern ließ, wie dies bei den oben erwähnten Kohlehydraten der Fall ist.

Um das Verhalten gerösteten Hafers gegenüber gewöhnlichem, ungeröstetem beurteilen zu können, verfolgte ich den

Blutzuckerspiegel nach 85 g gewöhnlichem Hafer bzw. 85 g geröstetem Hafer über 3 Stunden jeweils beim mittelschweren Diabetiker und beim Stoffwechselgesunden unter Zugrundelegen der Blutzuckerkurve nach Verabreichung der äquivalenten Menge Weißbrötchen.

Ich versuchte zunächst, aus Haferflocken und Hühnereiweiß ein Fladengebäck herzustellen, dieses dann im Wärmeschrank auf 160° C zu erhitzen und damit zu rösten. Die erhaltenen Plätzchen waren steinhart, trotz ganz geringer Dicke innen nicht geröstet. Sie waren nicht zu verwenden. Ich benutzte dann als Ausgangsmaterial gewöhnliches Hafermehl ohne Zusätze. Es wurde 20 Minuten lang im Aluminiumtopf auf mittelhoher Gasflamme geröstet, bis es, vorher gelblichweiß, tief bräunlich wurde. 85 g dieses Mehles, was einer Weißbrötchenmenge von 120 g, ausgerechnet nach Äquivalenztabelle, entspricht, in 1/2 l Wasser einmal kurz aufwallen lassen, ergibt einen Teller voll — nach Aussage der Patienten — wohl-schmeckender Hafersuppe. Ich habe, um ein möglichst klares Bild zu bekommen, darauf verzichtet, die Suppe durch Zusätze schmackhafter zu machen. Selbstverständlich ist es möglich, etwa durch Maggis Suppenwürze oder sonstige für den Diabetiker unschädliche Gewürze, den Geschmack der Hafersuppe zu bessern.

Der Blutzucker wurde bestimmt nach der Methode von Hagedorn-Jensen.

1. Versuchsreihe.

2 stoffwechselgesunde Männer und 2 Frauen erhielten morgens nüchtern 120 g Weißbrötchen, an einem anderen Morgen Hafersuppe aus 85 g gewöhnlichem Hafermehl und Wasser. Aus der folgenden Tabelle ist das Verhalten des Blutzuckerspiegels in den folgenden 3 Stunden zu ersehen.

Tabelle 1.

Blutzuckerkurven 1—5.

	Nüch- tern	Minuten						Nach Verabreichung von
		20	40	60	90	120	180	
Kurve 1 . . . mg %	63	102	83	82	86	81	81	Brötchen
Frl. B.	96	114	88	84	92	90	88	Hafer
Kurve 2 . . . mg %	96	114	106	102	106	96	84	Brötchen
Herr J.	104	136	128	104	110	104	96	Hafer
Kurve 3 . . . mg %	96	114	106	102	106	96	84	Brötchen
Herr I.	92	122	116	106	100	100	108	Hafer
Kurve 4 . . . mg %	63	102	83	82	86	81	81	Brötchen
Frau I.	116	122	130	108	110	120	112	Hafer
Kurve 5 . . . mg %	84	112	96	94	102	90	84	Brötchen
Durchschnitt 1—4	104	124	110	100	104	104	100	Hafer

Der Blutzuckerspiegel nach Hafersuppe liegt beim Stoffwechselgesunden während des ganzen Kurvenverlaufs durchschnittlich 15 mg % höher als nach Brötchen. Beide Kurven laufen parallel, es besteht also beim Normalen kein wesentlicher Unterschied im Verhalten des Blutzuckers nach Verabreichung von Brötchen und nach gewöhnlichem, ungeröstetem Hafer.

2. Versuchsreihe.

6 mittelschwere Diabetiker, alle auf eine bestimmte Diät ohne Insulin eingestellt, erhielten ebenfalls morgens nüchtern 85 g ungerösteten Hafer als Suppe und an einem anderen Tag 120 g Weißbrötchen. Eine genau festgesetzte Kost der Vortage, bei allen Patienten gleich, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre, ließ sich bei den durchweg ambulanten Patienten leider nicht durchführen. Der Blutzuckerspiegel verhielt sich wie folgt:

Tabelle 2.
Blutzuckerkurven 6—12.

	Nüch- tern	Minuten						Nach Verabreichung von
		20	40	60	90	120	180	
Kurve 6 . . . mg %	114	178	204	210	216	242	220	Brötchen
Herr L.	104	144	164	184	190	188	176	Hafer
Kurve 7 . . . mg %	204	264	300	324	334	340	334	Brötchen
Herr Ja.	186	258	296	280	244	264	260	Hafer
Kurve 8 . . . mg %	206	252	294	322	346	362	252	Brötchen
Herr Kö.	214	236	252	256	248	282	200	Hafer
Kurve 9 . . . mg %	90	160	162	176	172	154	104	Brötchen
Herr Ho.	106	176	182	170	134	110	90	Hafer
Kurve 10 . . mg %	120	144	190	224	212	204	278	Brötchen
Frau D.	186	252	262	280	246	230	160	Hafer
Kurve 11 . . mg %	166	192	202	250	242	244	252	Brötchen
Herr He.	150	180	216	224	252	248	248	Hafer
Kurve 12 . . mg %	144	198	236	252	246	252	234	Brötchen
Durchschnitt 6—11	160	206	230	234	214	220	188	Hafer

Mit einer Ausnahme (11) ist allen Kurven gemeinsam, daß die Gipfel der Haferkurven höher liegen als die der Brötchenkurven und die Anstiege nicht so hoch sind, durchschnittlich nach Hafer 30 mg % tiefer liegen als nach Weißbrötchen. In der 2. und 3. Stunde laufen beide Kurven parallel. Wenn auch die Haferkurve 30 mg % tiefer liegt, so ist doch der Abfall des Blutzuckerspiegels nach ungeröstetem Hafer ebenso protrahiert wie nach Brötchen und der Nüchternwert nach 3 Stunden noch nicht wieder erreicht.

3. Versuchsreihe.

1 stoffwechselgesunde Frau und 1 Mann erhielten morgens nüchtern Hafersuppe aus 85 g geröstetem Hafermehl mit Wasser, an einem anderen Tag 120 g Weißbrötchen.

Tabelle 3.

Blutzuckerkurven 13—15.

	Nüch- tern	Minuten						Nach Verabreichung von
		20	40	60	90	120	180	
Kurve 13 . . mg % Frl. Ba.	66 104	106 134	88 124	86 112	92 104	82 108	82 88	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 14 . . mg % Herr J.	98 106	114 134	106 128	104 108	108 94	96 92	88 86	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 15 . . mg % Durchschnitt 13+14	82 104	108 136	96 128	94 108	108 94	90 94	82 88	Brötchen geröstetem Hafer

Auch hier liegt wieder, wie bei den Kurven nach ungeröstetem Hafer, beim Stoffwechselgesunden der Blutzuckerspiegel nach geröstetem Hafer, wenigstens in der 1. Stunde, um 30 mg % höher als nach Brötchen. In der 2. und 3. Stunde verläuft die Kurve nach geröstetem Hafer zusammen mit der Brötchenkurve, der Blutzucker ist also, da er vorher höher angestiegen war, nach geröstetem Hafer beim Normalen schneller abgefallen als nach Brötchen. Wesentlich ist dieser Unterschied jedoch nicht.

4. Versuchsreihe.

10 mittelschwere Diabetiker, die ebenfalls diätetisch, ohne Insulin, eingestellt waren (leider konnten aus äußeren Gründen nicht die gleichen Patienten genommen werden wie in der vorhergehenden Versuchsreihe mit ungeröstetem Hafer) erhielten morgens nüchtern einen Teller Hafersuppe aus 85 g geröstetem Hafermehl, an einem anderen Morgen 120 g Weißbrötchen. Der Blutzuckerspiegel, über 3 Stunden verfolgt, sieht so aus:

Tabelle 4.
Blutzuckerkurven 16—22.

	Nüch- tern	Minuten						Nach Verabreichung von
		20	40	60	90	120	180	
Kurve 16 . . mg % Frau He.	164 136	176 170	180 194	194 198	244 200	270 148	230 124	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 17 . . mg % Herr Do.	226 200	236 260	260 268	270 262	276 260	340 250	354 200	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 18 . . mg % Frau Fi.	80 94	122 126	122 154	96 144	86 96	96 84	80 34	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 19 . . mg % Herr Th.	222 212	226 250	319 300	308 302	354 306	336 288	270 294	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 20 . . mg % Herr Fr.	112 132	114 170	120 220	150 260	159 240	168 196	198 156	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 21 . . mg % Frau Dr.	172 174	250 214	264 218	290 270	320 264	324 254	256 228	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 22 . . mg % Herr An.	96 80	112 150	136 110	122 102	128 88	110 82	86 78	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 23 . . mg % Herr Ca.	108 110	122 172	144 232	130 220	196 210	156 190	110 172	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 24 . . mg % Frau He.	148 148	210 190	250 218	244 234	252 232	222 212	216 190	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 25 . . mg % Frau Hr.	120 120	132 152	140 162	128 162	122 118	116 110	82 96	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 26 . . mg % Durchschnitt 16—25	140 140	170 184	192 208	200 218	210 206	210 176	190 156	Brötchen geröstetem Hafer
Kurve 27 . . mg % Gesamtdurch- schnittskurve	140 156 140	186 204 194	208 230 204	226 234 206	232 210 196	238 218 176	212 180 154	Brötchen Hafer geröstetem Hafer

Der Gipfel der Blutzuckerkurve nach geröstetem Hafermehl liegt, von einigen Ausnahmen abgesehen, bei denen er höher

liegt — solche haferempfindlichen Fälle sind bekannt — wesentlich tiefer als nach Brötchen und tiefer als nach ungeröstetem Hafermehl. Das geht vor allem aus der Gesamtdurchschnittskurve deutlich hervor. Allen Kurven nach geröstetem Hafermehl aber ist gemeinsam, daß der Gipfel spätestens in einer Stunde erreicht ist, sehr viel früher als nach Brötchen und früher als nach ungeröstetem Hafermehl. Der Abfall des Blutzuckerspiegels ist ausnahmslos schneller als nach Brötchen, auch schneller als nach gewöhnlichem Hafermehl, und der Nüchternwert ist nach 3 Stunden fast immer erreicht, was nach Brötchen niemals, nach ungeröstetem Hafermehl sehr selten der Fall ist.

Auswertung und Deutung.

Bei Betrachtung der vorstehenden Blutzuckerbelastungskurven zeigt sich, daß nach Verabfolgung von 120 g Weißbrot und äquivalenten Mengen (= 85 g) ungeröstetem und geröstetem Hafermehl beim Stoffwechselgesunden keine wesentlichen Unterschiede im Verlauf der Kurven entstehen. Der Blutzuckerspiegel liegt nach ungeröstetem Hafermehl dauernd etwas höher als nach Weißbrot; nach geröstetem Hafermehl ist er nur in der ersten Stunde höher, im weiteren Verlauf bleibt er jedoch auf gleicher Höhe wie nach Weißbrot. Über den Grund dieses Verhaltens werden sich nur Vermutungen äußern lassen. Es könnten andere Resorptionsbedingungen die Ursache sein. Um so auffallender ist das fast entgegengesetzte Verhalten beim Diabetiker: Sind schon die Kurven nach ungeröstetem Hafermehl viel günstiger, eine ja seit v. Noorden längst bekannte Tatsache, der Anstieg ist nicht so hoch wie nach Weißbrot, der Gipfel liegt zeitlich eine Stunde früher, nur der Abfall des Blutzuckerspiegels ist noch protrahiert und der Nüchternwert nach 3 Stunden noch nicht erreicht, so sind die Kurven nach geröstetem Hafermehl fast kaum noch „diabetisch“ zu nennen. Sie erfüllen beinahe die Anforderungen, die an eine normale Belastungskurve gestellt werden: der höchste Anstieg des Blutzuckers fällt in die erste Stunde, der

Blutzuckerspiegel sinkt schnell, nicht protrahiert, und der Nüchternwert ist nach 3 Stunden praktisch erreicht. Auch bei den wenigen Patienten, die mit einem sehr hohen Blutzuckeranstieg reagierten, nimmt zumindest die Kurve keinen protrahierten Verlauf.

Über die Ursachen dieser guten Verträglichkeit des gerösteten Hafers sind auch nur Vermutungen zu äußern. Ob der gegen die übrigen Cerealien hohe Fett- und Eiweißgehalt des Hafermehls, sein relativ hoher Vitamin-B₁-Reichtum, sein Basengehalt oder gar ein insulinähnlich wirkender Stoff die Hauptrolle spielt, ist kaum zu entscheiden; wahrscheinlich sind alle diese Faktoren an der Wirkung beteiligt. Durch die Röstung kommt noch der Karamelisierungseffekt hinzu, der aber sicher bei anderen Cerealien auch zu erreichen ist: teilweise Umwandlung in Dextrine, Anhydrosucker, kurz, Karamelprodukte, die ohne den Umweg über Glukose in Glykogen umgewandelt werden sollen. Inwieweit die besondere Reaktionslage des diabetischen Stoffwechsels einer solchen direkten Verwertung dieser Kohlehydrate entgegen kommt, bleibt fraglich. Jedenfalls ist das andere Verhalten des Stoffwechselgesunden zum gerösteten Hafer, nämlich mit einem höheren Blutzuckeranstieg zu reagieren als nach Weißbrot, auffällig. Diese Tatsache begegnet auch dem Einwand, bei dem Röstprozeß werde ein Teil der Kohlehydrate zerstört oder unverwertbar gemacht, und daher rühre die scheinbar günstige Belastungskurve. Gleichgültig, welche Gründe es nun haben mag, die bessere Verträglichkeit des gerösteten Hafers gegenüber ungeröstetem geht aus den Belastungskurven deutlich hervor.

Zusammenfassung.

Nach einer kurzen Übersicht über die bisher in der diätetischen Behandlung des Diabetes verwendeten Ersatzkohlehydrate unter besonderer Berücksichtigung der karamelisierten Kohlehydrate wird an Hand von Blutzuckerbelastungskurven die Verträglichkeit von geröstetem Hafer im Vergleich

zu ungeröstetem und Weißbrot beim Diabetiker untersucht. Es zeigt sich, daß sich die bekannt gute Verträglichkeit des Hafers für den Diabetiker durch Karamelisierung (Röstung) noch weiter steigern läßt.

Herrn Prof. Dr. Heupke danke ich sehr für die Überlassung des Themas dieser Arbeit und für die weitgehende Unterstützung, die mir jederzeit zuteil wurde.

Literatur.

Grafe: Stoffwechselkrankheiten.

— Das Karamel in der Diabetestherapie.

von Noorden: Die Zuckerkrankheiten und ihre Behandlung.

von Müller: Über diätetische Behandlung des Diabetes. Dtsch. med. Wschr. 1936, 1.

I. Mouzon: Die karamelisierten K. H. in dem Regime des Diabetes. Presse med. 1927, 51.

Gottschalk: Die Ersatzkohlehydrate in der Diabetestherapie. Klin. Wo. 1929, 2.

— Die Bedeutung der Ersatzkohlehydrate für die Praxis und Theorie der Zuckerkrankheit. Erg. Inn. Med.

— Chemismus und Verwertung der Ersatzkohlehydrate durch den diabetischen Organismus. Dtsch. Arch. klin. Med. 1921, 164.

Tannhauser: Über die Verwertung von Glucosan im diabetischen Organismus. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. 1926, 110.

Wolf: Das Verhalten der karamelisierten K. H.

Iovanowitsch: Lävulose beim Diabetiker. Soc. biol. Paris.

Pollak: Über das Verhalten des Diabetikers in der Galaktoseassimilation. Ztschr. klin. Med. 124.

Kaufmann: Über Salabrose. Ztschr. f. exp. Med., Bd. 60.

Großmann: Verwendung des Oxanthins bei Diabetikern. Klin. Wo. 1938, 7.

Lambie: Über Dioxyazeton. Biochem. Journ. 1937, 3.

Barvne: Einfluß des Sorbits auf Glykämie. Journ. acad. Med. 1931, 94.

Grott u. a.: Toleranz für Glukose, Lävulose, Galaktose.

Lebenslauf.

Am 21. April 1914 wurde ich in Offenbach a. M. als Tochter des Vorstehers des Arbeitsamtes Hermann Bayersdorf und seiner Ehefrau Anne, geb. Wagner, geboren. Ich besuchte die Vorschule in Offenbach a. M. und in Höchst a. M., wohin mein Vater versetzt worden war. 1923 wurden wir von der Besatzungsbehörde ausgewiesen, ich besuchte 2 Jahre das Lyzeum in Bad Homburg v. d. H. 1925 konnten wir nach Höchst zurückkehren, wo ich 1933 das Abitur an der Oberrealschule bestand.

Vom Sommersemester 1933 ab studierte ich Medizin an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt a. M. Im Juni 1935 bestand ich die ärztliche Vorprüfung und im Oktober 1938 das medizinische Staatsexamen. Danach war ich in der Universitäts-Kinderklinik, auf der inneren Abteilung des Diakonissenkrankenhauses in Frankfurt a. M. und in der Heil- und Pflegeanstalt in Hildburghausen (Thür.) als Medizinalpraktikantin tätig. Seit 1 Jahr, nachdem ich im Dezember 1939 die Approbation erhalten habe, arbeite ich als Assistentin auf der chirurgischen Abteilung des Diakonissenkrankenhauses in Frankfurt a. M. Am 17. August 1940 heiratete ich den Assistenzarzt Lothar Jensch aus Höchst a. M.

Hilde Jensch.